

Föreläsning 17:

①

Bevis: Vi visar det för fallet $x > 0$:

②

Standardderivator:

Vi har nedan visat

Sats: $D e^x = e^x$
 $D \ln x = \frac{1}{x}, x > 0$

Ex: Derivera $\ln|x|, x \neq 0!$

$$\ln|x| = \begin{cases} \ln x & \text{då } x > 0 \\ \ln(-x) & \text{då } x < 0 \end{cases}$$

$x > 0$: $D \ln|x| = D \ln x = \frac{1}{x}$ enligt ovan.

$x < 0$: $D \ln|x| = D \ln(-x) = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x}$.
kedjeregeln immediata

Sats: $D \ln|x| = \frac{1}{x}, x \neq 0$

Bevis: Se exempel ovan!

Sats: $D x^\alpha = \alpha x^{\alpha-1}, \alpha$ konstant

$$D x^\alpha = D e^{\ln x^\alpha} = D e^{\alpha \ln x} \stackrel{\text{kedje-regeln}}{=} e^{\alpha \ln x} \cdot D(\alpha \ln x) = e^{\alpha \ln x} \cdot \frac{\alpha}{x} = x^\alpha \cdot \frac{\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1} \quad D$$

Ex (Derivata av ett polynom):

$$D(7x^5 + 3x^3 + 2) = 7 \cdot 5 \cdot x^4 + 3 \cdot 3 \cdot x^2 + 0 = 35x^4 + 9x^2$$

Ex: Derivera $x^x!$

OBS! $D x^x \neq x \cdot x^{x-1}$ ej konstant!

Rätt sätt: $D x^x = D e^{\ln x^x} = D e^{x \ln x} \stackrel{\text{kedje-regeln}}{=} e^{x \ln x} \cdot D(x \ln x) = e^{x \ln x} (1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x}) = x^x (\ln x + 1)$
produktregeln

Sats: $D a^x = a^x \ln a, a > 0$ konstant

Bevis: $D a^x = D e^{\ln a^x} = D e^{x \ln a} \stackrel{\text{kedje-regeln}}{=} e^{x \ln a} \cdot D(x \ln a) = e^{x \ln a} \cdot \ln a = a^x \ln a \quad D$

Sats: (i) $D \sin x = \cos x$
 (ii) $D \cos x = -\sin x$
 (iii) $D \tan x = \frac{1}{\cos^2 x}$
 (iv) $D \cot x = -\frac{1}{\sin^2 x}$

③

Ex: Beräkna $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x}$! ("0/0")

$$\frac{\cos x - 1}{x} = \frac{(\cos x - 1)(\cos x + 1)}{x(\cos x + 1)} = \frac{\cos^2 x - 1}{x(\cos x + 1)} =$$

$$\stackrel{\text{trigon}}{=} \frac{-\sin^2 x}{x(\cos x + 1)} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{-\sin x}{\cos x + 1} \rightarrow 1 \cdot \frac{-\sin 0}{\cos 0 + 1} = \underline{\underline{0}}, x \rightarrow 0$$

Bevis (satsen ovan):

(i): $\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} = \sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \frac{\sin h}{h} \rightarrow \cos x, h \rightarrow 0$
0 eul. ovan 1

(ii) $D \cos x = D \sin(\frac{\pi}{2} - x) \stackrel{\text{kedjeregeln}}{=} \cos(\frac{\pi}{2} - x) \cdot D(\frac{\pi}{2} - x) =$

$$= \cos(\frac{\pi}{2} - x) \cdot (-1) = -\sin x$$

(iii) $D \tan x = D \frac{\sin x}{\cos x} \stackrel{\text{kvotregeln}}{=} \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \stackrel{\text{trig. ident}}{=} \frac{1}{\cos^2 x}$

④

(iv) På motsv. sätt som (iii) \square

Ex: Derivera $f(x) = x \cos(x^2)!$

$$D x \cos(x^2) = 1 \cdot \cos(x^2) + x \cdot (-\sin(x^2)) \cdot 2x = \cos(x^2) - 2x^2 \sin(x^2)$$

Sats: (i) $D \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
 (ii) $D \arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
 (iii) $D \arctan x = \frac{1}{1+x^2}$
 (iv) $D \operatorname{arccot} x = -\frac{1}{1+x^2}$

Bewis: (i): $y = \arcsin x \Leftrightarrow x = \sin y \quad -\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ (5)

$$D \arcsin x = \frac{1}{D \sin y} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{\cos^2 y}} =$$

OBS! $\cos y \geq 0$ då $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

(ii) Gör som i (i)!

(iii) $y = \arctan x \Leftrightarrow x = \tan y, \quad -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$

$$D \arctan x = \frac{1}{D \tan y} = \frac{1}{\frac{1}{\cos^2 y}} = \cos^2 y =$$

$$= \frac{\cos^2 y}{\cos^2 y + \sin^2 y} = \frac{1}{1 + \frac{\sin^2 y}{\cos^2 y}} = \frac{1}{1 + \tan^2 y} =$$


$$= \frac{1}{1 + x^2}$$

(iv) Gör som i (iii)! □

tidpunkt med en hastighet av $\frac{3}{2}$ cm/s. Med (7)
vilken hastighet förändras ballongens volym vid denna tidpunkt?

Lösning:

$$V(t) \text{ cm}^3$$



Vi vet att $r'(t_0) = 3/2$ och

vill beräkna $V'(t_0)$. Dessutom vet vi att $r(t_0) = 8$.

Samband: $V(t) = \frac{4\pi}{3} r(t)^3$

Observera att funktionerna $V(t)$ och $r(t)$ är "okända".

Vi deriverar ledvis:

$$V'(t) = \frac{4\pi}{3} \cdot 3 r(t)^2 \cdot r'(t) = 4\pi r(t)^2 r'(t)$$

← inne derivata

Såh $t = t_0$:

$$V'(t_0) = 4\pi r(t_0)^2 r'(t_0) = 4\pi \cdot 8^2 \cdot \frac{3}{2} =$$

$$= 384\pi$$

Svar: $384\pi \text{ cm}^3/\text{s}$.

(Hoppa över avsnittet "Derivation av komplex-
värda funktioner" (så länge)

Ex: Beräkna (i) $D \cosh x$! (6)
(ii) $D \sinh x$

Def:
$$\begin{cases} \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\ \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \end{cases}$$
 Vi får

$$D \cosh x = D \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) = \frac{e^x + (-1)e^{-x}}{2} =$$

$$= \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x$$

$$D \sinh x = D \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) = \frac{e^x - (-1)e^{-x}}{2} =$$

$$= \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x$$

Implicit derivering:

Implicit derivering \approx derivering av en "okänd" funktion. Kan användas för att hitta samband mellan olika derivator!

Ex: En klotformad ballong blåses upp. Vid en viss tidpunkt t_0 är ballongens radie 8 cm, och ballongens radie väver vid denna

Logaritmisk derivering (övertkurs): (8)

Ex: Derivera $f(x) = \frac{e^{x^2} \cdot (2x^2 + 4)^5}{\sin 2x \cdot (\arctan x)^3}$!

Lösning:

$$\ln |f(x)| = \ln \left| \frac{e^{x^2} \cdot (2x^2 + 4)^5}{\sin 2x \cdot (\arctan x)^3} \right| \quad \leftarrow \begin{matrix} \text{logaritmu-} \\ \text{lagar} \end{matrix}$$

$$= \ln e^{x^2} + \ln (2x^2 + 4)^5 - \ln |\sin 2x| - \ln |\arctan x|^3 =$$

$$= x^2 + 5 \ln (2x^2 + 4) - \ln |\sin 2x| - 3 \ln |\arctan x|$$

$$\Rightarrow D \ln |f(x)| = 2x + \frac{5 \cdot 4x}{2x^2 + 4} - \frac{2 \cos 2x}{\sin 2x} - 3 \cdot \frac{1}{1+x^2} =$$

$$= 2x + \frac{10x}{x^2 + 2} - 2 \cot 2x - \frac{3}{(x^2 + 1) \arctan x}$$

Samtidigt vet vi från kedjeregeln att

$$D \ln |f(x)| = \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x) \Leftrightarrow f'(x) = f(x) \cdot D \ln |f(x)|$$

Svar:

$$f'(x) = \frac{e^{x^2} \cdot (2x^2 + 4)^5}{\sin 2x \cdot (\arctan x)^3} \cdot \left(2x + \frac{10x}{x^2 + 2} - 2 \cot 2x - \frac{3}{(x^2 + 1) \arctan x} \right)$$